

Synthèse pluriannuelle des notations de fusariose des épis

Comportement des variétés à *Fusarium graminearum*

Demi Précoces C2				
Variétés	nb essais 2008-2015	% d'épis touchés		
		Moyenne estimée	Intervalle de confiance	
			Valeur minimale	Valeur maximale
DKC4408	13	5.6	3.1	8.7
DKC4522	16	2.4	0.9	4.5
DKC4530	6	5.2	2.1	9.2
DKC4541	5	11.1	6.4	16.4
DKC4590	18	3.2	1.5	5.5
DS0610C	4	2.3	0.3	6.0
DS1071C	6	10.0	5.7	14.9
ES FLATO	18	8.1	5.3	11.2
FERARIXX	16	2.9	1.2	5.2
KAMPONI CS	3	5.3	1.5	10.9
KASSANDRAS	13	2.4	0.9	4.8
KOMPARES	3	10.5	5.0	17.2
KONFESS	8	3.8	1.5	7.0
MARTELI	8	2.5	0.7	5.3
MAS 33A	7	0.4	0.0	2.1
MAS 37V	14	1.5	0.4	3.4
OBIXX	20	2.7	1.2	4.7
ORGANDI CS	9	3.6	1.5	6.6
P9578	13	5.3	2.9	8.4
PR37Y12	8	7.9	4.4	12.0
PR38A79	8	1.5	0.2	4.0
PR38T76	8	6.4	3.2	10.4
RGT PREFIXX	3	8.7	3.6	15.1
SHEXXPIR	13	8.0	5.0	11.4
SY DARTONA	3	9.3	4.0	15.8
SY IZOAR	3	2.6	0.3	7.2
VENITIO	6	2.1	0.4	5.0
Moyenne ramenée à 5% d'épis touchés		5.0		
min		0.4		
Max		11.1		

Synthèse sur des essais à extériorisation significative des symptômes

Sources des essais : Réseau Post-Inscription et essais spécifiques ARVALIS (24 essais),
Réseau CTPS-GEVES (2 essais)