

Synthèse pluriannuelle des notations de fusariose des épis

Comportement des variétés à *Fusarium graminearum*

Précoces				
Variétés	nb essais 2008-2015	% d'épis touchés		
		Moyenne estimée	Intervalle de confiance	
			Valeur minimale	Valeur maximale
ADEVEY	6	2.9	0.5	7.2
AMELIOR	5	2.0	0.1	6.0
ANJOU 277	5	10.0	4.8	16.3
DKC3398	6	4.0	1.1	8.6
DKC3409	5	3.6	0.7	8.4
DKC3730	4	2.7	0.2	7.6
DKC4250	5	0.9	0.0	3.9
DS0493B	4	5.3	1.3	11.3
ES COCKPIT	3	2.5	0.1	8.0
ES TOLERANCE	4	0.6	0.0	3.8
KANDIS	8	9.4	5.0	14.5
KASIMENS	4	7.5	2.6	14.1
KATARI CS	4	0.9	0.0	4.4
KLAMAS	4	2.0	0.1	6.5
KOHERENS	11	7.1	3.6	11.4
KOMPROMIS	5	8.0	3.4	14.0
KONKORDANS	5	4.3	1.0	9.4
KOUTELAS	4	4.1	0.8	9.5
KREOLIS	4	6.1	1.8	12.3
KROISSANS	4	9.1	3.7	16.0
LG3240	4	3.2	0.4	8.2
LG3258	7	10.3	5.6	15.8
LINDSEY	4	5.7	1.5	11.8
LUIGI CS	4	1.6	0.0	5.7
MAS 21D	11	6.0	2.8	10.1
MAS 29T	4	1.5	0.0	5.7
MERCURIO	5	5.8	1.9	11.3
MILLESIM	7	10.9	6.0	16.6
RIVALDINIO KWS	3	8.4	2.7	15.9
RONALDINIO	10	7.6	3.9	12.2
SANTURIO	5	5.3	1.6	10.6
SEBASTO	5	4.3	1.1	9.3
TENESSY	4	3.6	0.5	9.0
TRIOMPH	5	2.6	0.3	6.9
Moyenne ramenée à 5% d'épis touchés		5.0		
min		0.6		
Max		10.9		

Synthèse sur des essais à extériorisation significative des symptômes

Sources des essais : Réseau Post-Inscription ARVALIS (10 essais), réseau CTPS-GEVES (1 essai)